

Наименование исследования	1-й триместр	2-й триместр	3-й триместр
Сбор анамнеза	При 1-м визите		
Оценка риска ТЭО	При 1-м визите, далее – по показаниям		
Оценка жалоб	При каждом визите		
Общий осмотр	При 1-м визите		
Измерение роста, массы тела, ИМТ	При каждом визите		
Измерение АД и пульса	При каждом визите		
Пальпация молочных желез	При 1-м визите		
Гинекологический осмотр	При 1-м визите, далее - по показаниям		
Определение срока беременности и родов	При 1-м визите		
Измерение ОЖ, ВДМ и заполнение гравидограммы	-	При каждом визите после 20 недель	При каждом визите
Опрос на предмет характера шевелений плода	-	При каждом визите после 16-20 недель (после начала ощущения шевелений плода)	При каждом визите
Определение положения и предлежащей части плода	-	-	При каждом визите после 34-36 недель
Лабораторные диагностические исследования			
Направление на исследование уровня ХГ в сыворотке крови или в моче	При 1-й явке в 1м триместре и отсутствии УЗИ для диагностики беременности	-	-
Направление на исследование уровня антител классов М, G к ВИЧ-1/2 и антигена р24 в крови	Однократно при первом визите (+обследование партнера)	1-м визите (пациентки)	Однократно в 3-м триместре

<p>Направление на определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита В или определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В в крови</p>	<p>Однократно при 1-м визите партнера (пациентки) (+обследование па паци</p>		<p>Однократно в 3-м триместре</p>
<p>Направление на определение суммарных антител классов М и G к вирусу гепатита С в крови</p>	<p>Однократно при 1-м визите партнера (пациентки) (+обследование па паци</p>		<p>Однократно в 3-м триместре</p>
<p>Направление на определение антител к бледной трепонеме в крови</p>	<p>Однократно при 1-м визите партнера (пациентки) (+обследование па паци</p>		<p>Однократно в 3-м триместре</p>
<p>Направление на определение антител классов М и G к вирусу краснухи в крови</p>	<p>Однократно при 1- м визите</p>		<p>-</p>
<p>Направление на микроскопическое исследование влагалищных мазков, включая микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>), микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады (<i>Trichomonas vaginalis</i>), микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы</p>	<p>Однократно при 1- м визите</p>		<p>Однократно в 3-м триместре</p>
<p>Направление на определение основных групп по системе АВ0 и антигена D системы Резус (резус-фактор)</p>	<p>Однократно при 1-м визите (+определение резус-фактора партнера пациентки и у резус-отрицательных пациенток)</p>		
<p>Направление на определение антирезусных антител у резус-отрицательных женщин (при резусотрицательной принадлежности крови партнера определение антител к антигенам системы Резус не проводится)</p>	<p>При 1-м визите</p>	<p>В 18⁰-20⁰ недель</p>	<p>В 28⁰ недель</p>

Наименование исследования	1-й триместр	2-й триместр	3-й триместр
Направление на проведение общего (клинического) анализа крови	Однократно при 1-м визите	Однократно во 2м триместре	Однократно в 3-м триместре
Направление на проведение биохимического общетерапевтического анализа крови	Однократно при 1-м визите		
Направление на определение уровня глюкозы в крови	При выявлении уровня глюкозы венозной крови натощак $\geq 7,0$ ммоль/л		
Направление на проведение ПГТТ	-	В 24 ⁰ -28 ⁰ недель, если не было выявлено нарушение углеводного обмена или не проводилось обследование на ранних сроках беременности	-
Направление на исследование уровня ТТГ и определение содержания антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) в крови	Однократно при 1-м визите		
Направление на проведение общего (клинического) анализа мочи	Однократно при 1-м визите	Однократно во 2м триместре	Однократно в 3-м триместре
Проведение определения белка в моче с помощью специальных индикаторных полосок или в лабораторных условиях	-	При каждом визите после 22 недель	При каждом визите
Направление на проведение цитологического исследования микропрепарата шейки матки (мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала)	При 1-м визите. Проводится в зависимости от даты предыдущего исследования, его результатов, наличия инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, возраста пациентки согласно клиническим рекомендациям «Цервикальная интраэпителиальная неоплазия, эрозия и эктропион шейки матки» 2020 г.		
Направление на микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патогены с применением автоматизированного посева	Однократно при 1-м визите		
Направление на бактериологическое исследование вагинального отделяемого и ректального отделяемого на стрептококк группы В (<i>S. agalactiae</i>) или определение ДНК стрептококка группы В (<i>S. agalactiae</i>) во влагалищном мазке и ректальном мазке методом ПЦР	-	-	Однократно в 35 ⁰ 37 ⁰ недель
Скрининг 1-го триместра (исследования уровня ХГ в сыворотке крови, уровня белка А, связанного с беременностью, в крови (РАРР-А))	В 11 ⁰ -13 ⁶ недель	-	-
Инструментальные диагностические исследования			
Направление на УЗИ матки и придатков (до 9 ⁶ недель беременности) или УЗИ плода (после 10 ⁰ недель беременности)	При 1-м визите в 1-м триместре беременности и сроке задержки менструации ≥ 7 дней	-	-

Направление на УЗИ плода	В 11-13 ⁶ недель (в составе скрининга 1-го триместра) + измерение пульсационного индекса (PI)	В 18-20 ⁶ недель (УЗ-скрининг 2го триместра) + УЗИ шейки матки (УЗцервикометрия)	В 34 ⁰ -35 ⁶ недель
Направление на повторное УЗИ плода	При высоком риске ХА и/или пороков развития плода, ассоциированных с ХА по данным скринингового УЗИ	При высоком риске ХА и/или пороков развития плода, ассоциированных с ХА по данным скринингового УЗИ	При подозрении на неправильное положение или предлежание плода, при отсутствии ЧСС или нарушении ЧСС плода, при несоответствии размеров матки и срока беременности

Наименование исследования	1-й триместр	2-й триместр	3-й триместр
Направление на ультразвуковую доплерографию маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока	-	В 18 ⁰ -20 ⁶ недель в группе высокого риска акушерских и перинатальных осложнений	В 30 ⁰ -33 ⁶ недель в группе высокого риска акушерских и перинатальных осложнений
Направление на регистрацию электрокардиограммы	Однократно при 1-1 визите		Однократно в 3-м триместре
Аускультация плода с помощью фетального доплера или стетоскопа акушерского	-	При визите с каждой 22 ⁰ недель	При каждом визите
Направление на КТГ плода	-	-	С 32 ⁰ недель с кратностью 1 раз в 2 недели
Проведение пельвиометрии	-	-	Однократно
Консультации смежных специалистов			
Направление на консультацию врача-терапевта	Однократно при 1-1 визите		Однократно в 3-м триместре
Направление на консультацию врача-стоматолога	Однократно при 1-1 визите		Однократно в 3-м триместре
Направление на консультацию врача-офтальмолога	Однократно при 1-1 визите		
Направление на консультацию врача-генетика	Однократно при выявлении у пациентки факторов риска рождения ребенка с хромосомной аномалией		Однократно при выявлении у пациентки и/или ее мужа/партнера факторов риска рождения ребенка с хромосомной аномалией
Направление на консультацию врача-кардиолога	При патологически измененных электрокардиограммах		
Направление на консультацию медицинского психолога	Однократно при 1-1 визите		Однократно в 3-м триместре
Назначение лекарственных препаратов			
Назначение приема фолиевой кислоты**	400-800 мкг в день перорально	-	-
Назначение приема калия йодида**	200 мкг в день перорально	200 мкг в день перорально	200 мкг в день перорально
Назначение приема колекальциферола** в группе высокого риска гиповитаминоза витамина D	500-1000 МЕ в день перорально	500-1000 МЕ в день перорально	500-1000 МЕ в день перорально

Назначение введения иммуноглобулина человека антирезус Rho[D] резус-отрицательной пациентке с отрицательным уровнем антирезусных антител	-	-	В дозе, согласно инструкции к препарату, внутримышечно в 28-30 недель
--	---	---	---